Nódulo de tiroides e imagen ganglionar





En la primera imagen podemos observar un nódulo de tiroides de 15 mm de diámetro máximo. El mismo es isoecoico heterogéneo con halo parcial y la evaluación con doppler color muestra importante vascularización central y periférica.

La exploración de las cadenas ganglionares cervicales laterales reveló (imágen 2) un ganglio ipsilateral con alteración en la estructura, forma y vascularización al doppler color, con presencia de micro-calcificaciones y áreas quísticas.

El diagnóstico citológico realizado por PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina) y luego confirmado con biopsia quirúrgica, fue de un Carcinoma Papilar de Tiroides con metástasis ganglionares.

Nódulo de tiroides e imagen ganglionar

Criterios ecográficos sospechosos de malignidad de los nódulos tiroideos

- Hipoecogenicidad
- Microcalcificaciones
- Nódulo parcialmente quístico con localización excéntrica del componente líquido y lobulación del componente sólido
- Bordes irregulares
- Invasión del parénquima tiroideo perinodular
- Configuración taller than wide (más alto que ancho)
- Vascularización intranodal

**J. Fernández Sánchez. Clasificación TI-RADS de los nódulos tiroideos en base a una escala de puntuación modificada con respecto a los criterios ecográficos de malignidad. Rev Argent Radiol. 2014;78(3):138-148.*