2017 | Obesidad pediátrica: evaluación, tratamiento y prevención. Guía de la Endocri

Categoría: Endo pediátrica
Publicado: Viernes, 10 Marzo 2017 20:52
Escrito por: Endoweb
Visitas: 16789

Nuevas guías sobre la prevención y manejo de la obesidad en pediatría

Pediatric Obesityâ Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Styne DM. J Clin Endocrinol Metab. 2017 ;102(3): 709-757.



Puntos esenciales

- Los niños o adolescentes con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual al percentilo 85 deben ser evaluados para detectar afecciones relacionadas, como síndrome metabólico y diabetes.
- En los jóvenes que son evaluados por obesidad no es necesario medir sus valores de insulina en ayunas porque no tiene valor diagnóstico.
- Los niños o adolescentes afectados por obesidad no necesitan evaluaciones rutinarias de laboratorio para trastornos endocrinos que puedan causar obesidad a menos que su estatura o tasa de crecimiento sea menor a la esperada en función de la edad y la etapa puberal.
- Se deben considerar pruebas genéticas específicas cuando hay obesidad de inicio temprano (antes de los 5 años), un impulso mayor a consumir alimentos (hiperfagia extrema), otros hallazgos clínicos de síndromes de obesidad genética o antecedentes familiares de obesidad extrema.

©Copyrigth2018 ENDOweb.

Phoca PDF