

Categoría: Diabetes y Metabolismo

Publicado: Martes, 06 Febrero 2018 22:49

Escrito por: Equipo

Visitas: 14997

---

Guía de práctica clínica sobre pié diabético

***IDF Clinical Practice Recommendation on the Diabetic Foot: A guide for healthcare professionals. Ibrahim A. Diabetes Res Clin Pract. 2017 May;127:285-287. doi: 10.1016/j.diabres.2017.04.013.***



Las complicaciones del pie diabético representan una de las consecuencias más comunes e impactantes de la diabetes. La Federación Internacional de Diabetes (IDF) en sus guías actuales aborda la prevención y el tratamiento de las complicaciones del pie y prepara el escenario para estas guías enfatizando el alcance del problema.

La neuropatía diabética es la base de complicaciones más severas del pie como la úlcera y el pie de Charcot. La prevalencia de la neuropatía entre los pacientes con diabetes se ha estimado en un 16% a 66%. Sin embargo, menos de un tercio de los médicos pueden reconocer los síntomas y signos clínicos de la neuropatía diabética.

Las úlceras del pie diabético pueden ocurrir en hasta un 25% de los pacientes con diabetes durante su vida, y más de la mitad de estas úlceras se infectarán. Aproximadamente 1 de cada 5 casos de úlceras del pie diabético infectadas requieren amputación.

Las guías actuales de la IDF se centran en la apropiada estratificación del riesgo de las complicaciones del pie en pacientes con diabetes, así como en el manejo oportuno y apropiado de los factores de riesgo y de la enfermedad del pie.