Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de antidiuresis inadecuada

Categoría: 1 tema en 1 minuto
Publicado: Lunes, 08 Enero 2024 12:32
Escrito por: Sofia
Visitas: 4241

Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de antidiuresis inadecuada

Adrogué H & Madias N. N Engl J Med 389, 2023

Puntos clínicos claves:

â¢ La hiponatremia es la anomalía electrolítica más común. La afección suele ser causada por un exceso de agua en relación con el contenido de sodio y potasio.

â¢ En el SIAD, una causa frecuente de hiponatremia, el aumento de la secreción de hormona antidiurética en ausencia de estímulos osmóticos y hemodinámicos provoca retención de agua por parte de los riñones y exceso de agua.

â¢ Las manifestaciones de SIAD dependen de la rapidez del desarrollo y de la gravedad y duración de la afección. Los síntomas varían desde leves e inespecíficos (p. ej., debilidad y dolor de cabeza) hasta graves y potencialmente mortales (p. ej., convulsiones y coma).

â¢ Las causas del SIAD incluyen cáncer, medicamentos, afecciones pulmonares, trastornos del sistema nervioso central, estado posoperatorio, náuseas intensas y estrés; frecuentemente la causa es indeterminada.


â¢ El SIAD gravemente sintomático requiere tratamiento de emergencia con cloruro de sodio al 3% para revertir el edema cerebral. Se justifica la consulta con un especialista.

â¢ Las estrategias de manejo del SIAD incluyen la reversión o mejora del trastorno subyacente cuando sea posible; restricción de líquidos; suplementación con cloruro de sodio, a menudo con furosemida; y tratamiento con urea o tolvaptán.â

Phoca PDF

Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de antidiuresis inadecuada


Categoría: 1 tema en 1 minuto
Publicado: Lunes, 08 Enero 2024 12:32
Escrito por: Sofia
Visitas: 4241



Phoca PDF

Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de antidiuresis inadecuada

Categoría: 1 tema en 1 minuto
Publicado: Lunes, 08 Enero 2024 12:32
Escrito por: Sofia
Visitas: 4241



También podes descargarlo:

DESCARGAR PDF

Phoca PDF