

Carcinoma diferenciado de tiroides

Categoría: Casos clínicos interactivos

Publicado: Martes, 30 Noviembre -0001 00:00

Escrito por: Sofia

Visitas: 4529

â™€ 51 años

â€¢ Motivo de consulta: Seguimiento y tratamiento de bocio multinodular con nódulo en LI con PAAF Bethesda V

â€¢ Antecedentes personales: G2C2, ataques de pánico

â€¢ Antecedentes familiares: No tiroideopatía, no DBT

â€¢ Medicación: Paroxetina

â€¢ Examen físico: Clínicamente eutiroidea, tiroides y adenopatías no palpables

Estudios iniciales

Ecografía tiroidea:

LI nódulo hipoecoico sólido con microcalcificaciones de 13 mm (diámetro mayor)

D nódulos isoecoicos bordes regulares de 6 y 7 mm

Debajo del LI adenomegalia 12 mm con alteración de su estructura

PAAF:

Nódulo LI Bethesda V sospechoso de carcinoma papilar

Adenomegalia 12 mm: MTS carcinoma papilar; Tg en lavado de aguja 200 ng/ml

Laboratorio: TSH 1,95 mcUI/mL, T4L 0,92 ng/dl, **aTg 879 UI/ml**, aTPO 19 UI/ml

Carcinoma diferenciado de tiroides

Categoría: Casos clínicos interactivos

Publicado: Martes, 30 Noviembre -0001 00:00

Escrito por: Sofia

Visitas: 4529

(Continúa el caso clínico haciendo click [aquí](#))