Lobectomía en Cáncer de tiroides

Categoría: Casos clínicos interactivos
Publicado: Martes, 07 Octubre 2025 13:28
Escrito por: Sofia
Visitas: 2664

Caso clínico interactivo

Paciente masculino de 58 años que consulta por nódulo tiroideo de hallazgo incidental en Doppler de vasos de cuello.

Antecedentes personales:

- Gastritis, Enfermedad por reflujo gastroesofágico, toma omeprazol a demanda.
- Dislipidemia mixta, sin tratamiento actualmente.
- Antecedentes quirúrgicos: Tabique nasal , fractura de muñeca jugando al fútbol (25 años).

Antecedentes familiares: ninguno de relevancia.

Examen físico:

- P 110kg T 1.84 m IMC 32.3
- Tiroides: 20gr sin resaltos
- TA 120/85 mmHg FC 85 lpm

Estudios complementarios:

- 2024: TSH: 3.46 µUI/mL T4 Libre: 0.79 ng/dL aTPO neg aTg neg Colesterol Total (CT): 235 mg/dL Triglicéridos (TG): 249 mg/dL HDL: 36 mg/dL LDL: 149 mg/dL. Resto de la rutina sin particularidades

- 2025: Eco Doppler vasos cuello: Impresiona nódulo en LD

Conducta:

- Se indican medidas higiénico dietéticas, se solicita interconsulta con nutrición.

- Se solicita ecografía tiroidea.

Ecografía tiroidea:

- Se visualiza del lado derecho, a nivel del tercio inferior del lóbulo, una **imagen nodular sólida hipoecogénica de bordes lobulados y contenido predominantemente homogéneo que alcanza los 7 x 7 mm. Presenta señal doppler central.**
- Lóbulo derecho 15 x 15 x 45 mm. Lóbulo Izquierdo 8 x 16 x 34 mm. Sin adenopatías.

Phoca PDF

(continúa el caso haciendo click aquí)

Phoca PDF