

## Lobectomía en Cáncer de tiroides

Categoría: Casos clínicos interactivos  
Publicado: Martes, 07 Octubre 2025 13:28  
Escrito por: Sofia  
Visitas: 1843

---

### Caso clínico interactivo

Paciente masculino de 58 años que consulta por nódulo tiroideo de hallazgo incidental en Doppler de vasos de cuello.

### Antecedentes personales:

- Gastritis, Enfermedad por reflujo gastroesofágico, toma omeprazol a demanda.
- Dislipidemia mixta, sin tratamiento actualmente.
- Antecedentes quirúrgicos: Tabique nasal , fractura de muñeca jugando al fútbol (25 años).

**Antecedentes familiares:** ninguno de relevancia.

### Examen físico:

- P 110kg T 1.84 m IMC 32.3
- Tiroides: 20gr sin resaltos
- TA 120/85 mmHg FC 85 lpm

### Estudios complementarios:

- 2024: TSH: 3.46  $\mu$ UI/mL T4 Libre: 0.79 ng/dL aTPO neg aTg neg Colesterol Total (CT): 235 mg/dL Triglicéridos (TG): 249 mg/dL HDL: 36 mg/dL LDL: 149 mg/dL. Resto de la rutina sin particularidades
- 2025: Eco Doppler vasos cuello: Impresiona nódulo en LD

### Conducta:

- Se indican medidas higiénico dietéticas, se solicita interconsulta con nutrición.
- Se solicita ecografía tiroidea.

### Ecografía tiroidea:

- Se visualiza del lado derecho, a nivel del tercio inferior del lóbulo, una **imagen nodular sólida hipoecogénica de bordes lobulados y contenido predominantemente homogéneo que alcanza los 7 x 7 mm. Presenta señal doppler central.**
- Lóbulo derecho 15 x 15 x 45 mm. Lóbulo Izquierdo 8 x 16 x 34 mm. Sin adenopatías.

## Lobectomía en Cáncer de tiroides

Categoría: Casos clínicos interactivos

Publicado: Martes, 07 Octubre 2025 13:28

Escrito por: Sofia

Visitas: 1843

---

*(continúa el caso haciendo click [aquí](#))*