Orbitopatía de Graves

Categoría: Casos clínicos interactivos
Publicado: Viernes, 13 Marzo 2026 12:00
Escrito por: Sofia
Visitas: 2331

Caso clínico interactivo.

Objetivos de aprendizaje:

- Conocer cómo determinar la actividad y la severidad de la orbitopatía para guiar el manejo terapéutico.
- Identificar los factores de riesgo modificables en la evolución de la enfermedad.
- Analizar el impacto de los distintos tratamientos del hipertiroidismo (drogas anti tiroideas, radioyodo, cirugía) sobre la progresión de la orbitopatía.

Caso clínico:

Paciente masculino de 60 años que consulta por cuadro clínico de 3 meses de evolución caracterizado por temblor y palpitaciones.

Antecedentes personales:

- HTA
- TBQ (14 cigarrillos en el día)
- Niega alergias

Medicación actual: amlodipina 10 mg/d, perindopril 10 mg/d

- Trabaja de mesero en un restaurante (6 días/semana, turno de 7 a 15hs)
- Sedentario

Aporta laboratorio:

Hto 40,3	Hb 13,4	GB 10.550	N 46,4 %	L35,7 %	PQT 216.000
Glu 81	BT 0,93	Col 173	Na 140	K3,6	
TSH <0,02	**T41 4,3**	**T3 305**	**aTPO <20**	**TRAb 16,8 (h/ 1,75)**	

Examen físico:

- TA 145/96 mmHg FC 96 lat x min

Phoca PDF

- P 75 kg T 1,68 mts IMC 26,6
- Glándula tiroides: 35 gr difusa
- Piel tibia, sudorosa
- Temblor fino distal +
- A nivel ocular presenta quemosis, edema palpebral, leve retracción párpado inferior, refiere dolor al mover los ojos.

Impresión diagnóstica: Hipertiroidismo por Enfermedad de Graves

(continua el caso haciendo clic aquí)

Phoca PDF