Hacia una nueva farmacología para personas que viven con obesidad

Categoría: Noticias
Publicado: Miércoles, 04 Noviembre 2026 17:23
Escrito por: Sofia
Visitas: 23

Recientemente, nuevos estudios de fase 2 realizados en Taiwan han analizado la eficacia y seguridad del CBL-514. Este nuevo fármaco tiene como ***blanco a los adipocitos del tejido visceral, en quienes provoca la muerte celular programada***.

23 pacientes entre 36.4-42.4 años con un IMC entre 22 y 30 recibieron CBL-514 a dosis de 600 mg en forma inyectable en el abdomen cada 3 semanas y 17 pacientes placebo, hasta un periodo de 12 semanas. La medición de tejido adiposo visceral se realizó en forma basal y durante el seguimiento mediante resonancia magnética asistida por inteligencia artificial. ***Con este nuevo fármaco, la reducción de grasa visceral en la semana 4 fue del 12% (71 mL) y del 10% (63 mL) entre las semanas 8-12***. Sin embargo, el grupo placebo tuvo una ganancia de grasa visceral en todos los tiempos (6% en semana 4 y 12% al finalizar el estudio).

Los resultados de estos trabajos aquí comentados han sido presentados recientemente en el congreso de la Asociación Europea para el estudio de Diabetes (EASD), llevado a cabo recientemente en Milán.

Copyright 2026. Endoweb.net.

Phoca PDF